

PRAXIS FÜR KARDIOLOGIE

PD Dr.M.Neizel-Wittke • Dr.J.Ohler • Steinmetzstraße 47 • 41061 Mönchengladbach



Priv. Doz. Dr.med. Mirja Neizel-Wittke

Dr.med. Jürgen Peter Ohler

Ärzte für Innere Medizin

Kardiologie

Steinmetzstraße 47

41061 Mönchengladbach

phone: 0 21 61 5 670 670

fax: 0 21 61 5 670 671

praxis@kardiologie-az.de

www.kardiologie-az.de



Endokarditis-Prophylaxe:

(bitte dem behandelnden Zahnarzt/Arzt vorlegen.)

a) Therapeutische Eingriffe: Zahnärztliche Eingriffe mit Blutungen; Abszeßspaltungen; Mandelentfernungen, Spülungen und Operationen der Kieferhöhlen; Darmoperationen; urologische OP; Steinertrümmerung; Sklerosierung von Ösophagusvarizen; gynäkologische OP.

b) Diagnostische Eingriffe: Spiegelung der Bronchien, des Magen-Darm-Traktes mit Biopsie, der Bauchhöhle, des Dick- und Enddarms mit Biopsie, der Blase; Blasenkatheterismus, ERCP.

c) Fieberhafte Infekte: Antibiotika-Behandlung bei Verdacht auf bakterielle Erreger.

Endokarditis- prophylaxe

	MÄSSIGES RISIKO Einzeldosis 1h vor Eingriff	HOHES RISIKO z.B. frühere Endokarditis Mehrfachdosen über 16 h
Normalfall	Amoxicillin 3g p.os	Amoxicillin 3g p.os 1h vor sowie 1 g p.os nach 8 und 16 h
a. Staph. aureus ß. Abszesse	Flucloxacillin 2g p.os	Flucloxacillin 2g p.os 1 h vor sowie 500 mg p.os nach 8 und 16 h
Penicillin-Allergie	Clindamycin 600 mg p.os	Clindamycin 600 mg p.os 1 h vor sowie 300 mg p.os nach 8 und 16 h
Penicillin-Allergie und Eingriff gastrointestinal oder urogenital	Vancomycin 1 g als Infusion über 1 h vor dem Eingriff	Vancomycin 1 g als Infusion über 1 h vor sowie 1 g als Infusion 12 h nach dem Eingriff
alternativ (bei hospitalisierten Patienten): Parenterale Kombination:	Amoxicillin/Ampicillin 2g bzw. Di- oder Flucloxacillin 1g + Gentamycin 1,5 mg/kg i.v. 1/2 h vor sowie nach 8 und 16 h. Bei Penicillin-Allergie Vancomycin + Gentamycin i.v.	

Nach Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Herz- und Kreislaufforschung