

Dobutamin-Atropin-Stressechokardiographie – Dokumentationsbogen

Dobutamin 125 mg/50 ml = 2,5 mg/ml

Patient/in: _____ Geb.-Datum: _____ Datum: _____ Untersucher: _____


Phase	Dobutamin µg/kg/min	Perfusor ml/h	HF/min	RR mmHg	EKG / Rhythmus / Beschwerden
Ruhe	0				
Stufe 1	5				
Stufe 2	10				
Stufe 3	20				
Stufe 4	30				
Stufe 5	40				
Peak					
Recovery					

Atropin: _____ mg i.v. Ziel-HF: _____ /min Max. HF: _____ /min Abbruchgrund: _____

EKG-Befund / ST-Veränderungen / Arrhythmien:

17-Segment-Wandbewegungsanalyse

Direkte Markierung in den Polardiagrammen – N normal, H hypokinetisch, A akinetisch, D dyskinetisch



ASE-17-Segment-Legende

1 basal anterior 2 basal anteroseptal 3 basal inferoseptal 4 basal inferior 5 basal inferolateral 6 basal anterolateral
7 mid anterior 8 mid anteroseptal 9 mid inferoseptal 10 mid inferior 11 mid inferolateral 12 mid anterolateral
13 apikal anterior 14 apikal septal 15 apikal inferior 16 apikal lateral 17 Apex

Schnittbezogene Dokumentation / Bemerkungen

PLAX	
PSAX basal	
PSAX mid	
Apikaler 4-Kammerblick	
Apikaler 2-Kammerblick	
Apikaler 3-Kammerblick	

Gesamtbeurteilung

Ruhe-Wandbewegungsstörung: nein / ja
Induzierbare Ischämie: nein / ja
Biphasische Reaktion/Vitalität: nein / ja
WMSI Ruhe: _____ WMSI Peak: _____

Ischämie-Lokalisation / Koronarterritorium:

